



بکشد و شما روی تخت سفتی دراز بکشید پس حوصله داشته باشید .

۵- ممکن است احساس تپش قلب و ناخوشایندی در حین عمل پیدا کنید که طبیعی است و نگران نشوید .


این کار دردناک نیست ولی ممکن است چند ساعت طول بکشد که باعث خستگی شما می شود در طول عمل احتمال دارد احساس ناخوشایندی ناشی از بی نظمی و تپش قلب را احساس کنید که این حالت توسط پزشک ایجاد می شود و

(که میتواند بصورت تپش قلب خود را نشان دهد) و یا ایست قلبی اتفاق می افتد. همچنین نشانه هایی از قبیل سرگیجه و سنکوپ و بی حالی و کاهش سطح هوشیاری میتواند از نشانه های بی نظمی قلبی باشد. از این روش (ابلیشن) جهت حذف نقاط ایجاد کننده بی نظمی با انرژی حرارتی استفاده میشود. روش ابلیشن در اغلب موارد با استفاده از امواج صوتی انجام میگردد که شامل قرار دادن یک کاتتر ویژه در محل بی نظمی و یا نزدیک به آن است . انرژی حرارتی از طریق کاتتر عبور کرده و سلول های نابجا را تخریب میکند..

مراقبت های قبل از عمل :

- ۱- بایستی حداقل ۶ ساعت قبل از عمل ناشتا باشید .
- ۲- داروهای ضد بی نظمی را حداقل از ۵ روز قبل قطع کنید .
- ۳- اگر تحت درمان با وارفارین هستید ۴۸ ساعت قبل از عمل قطع شود .
- ۴- این عمل ممکن است چند ساعت طول

قلب یک عضو عضلانی است که در مرکز قفسه سینه قرار گرفته است و خون را به داخل بافتها پمپ میکند و از این طریق اکسیژن و سایر مواد غذایی را به بافتها می رساند . همچنین قلب دارای یک سری سلولهای اختصاصی (الکتریکی) است که تولید و هماهنگی و انتقال امواج الکتریکی را به عهده دارند . عملکرد قلب بر اساس فعالیت مکانیکی و الکتریکی آن می باشد .



زمانی که فعالیت الکتریکی قلب دچار اختلال می شود عوارضی مانند انواع بی نظمی های قلبی

ریشه کنی بی نظمی یا ابلیشن

(Ablation)



تهیه و تنظیم: زهره صادقی

با همکاری واحد آموزش پرستاری بیمارستان کوثر

شماره سند: PF- PRD- 2000

تاریخ بازنگری: ۹۶/۷/۱

تایید کننده: دکتر سید شهاب الدین شهرزاد

متخصص قلب و عروق

منبع: کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث

آدرس: شیراز - خیابان قصردهشت - بعد از پل زیر گذر - بنیاد قلب فارس - بیمارستان کوثر

بیمارستان کوثر: صندوق پستی: ۶۹۷ - ۷۱۹۵۵

تلفن: ۶۲۳۱۵۱۵ - ۷۱۳ - نماپر: ۶۲۵۰۵۰۰ - ۷۱۳

www.kowsar-hospital.ir

۳- در صورت احساس تپش و ضربان سریع قلب حتماً هر چه سریعتر به اولین مرکز درمانی مراجعه کرده و نوار قلب بگیرید و به پزشک خود مراجعه کنید .

۴- این عمل محدودیتی در زندگی شما ایجاد نمی کند مگر اینکه بیماری و مشکل دیگری داشته باشید که پزشک معالجتان برای شما توضیح خواهند داد .

با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما

جای نگرانی ندارد ، بهتر است شما آرام باشید و شکایت خود را بیان کنید این وضعیت طولانی نیست و رفع می شود و در صورت نیاز ، درمان لازم جهت برقراری ریتم طبیعی قلب انجام می شود .

مراقبت های بعد از عمل :

۱- پای سمت محل عمل بایستی چند ساعت (بستگی به نظر پزشک) بیحرکت باشد .

۲- با اجازه پزشک و پرستار بعد از چند ساعت بایستی از تخت پائین بیایید و راه بروید . در پائین آمدن از تخت عجله نکنید ابتدا ۱۰-۵ دقیقه کنار تخت بنشینید و چنانچه سرگیجه و ضعف نداشتید از تخت پائین آمده و راه بروید .

نکات مهم پس از ترخیص و مراجعه به منزل :

۱- محل عمل بایستی از نظر خونریزی چک شود، به محل عمل فشار نیاورید و اشیاء سنگین را بلند نکنید .

۲- کمی درد در محل عمل طبیعی است ولی اگر سفتی و کبودی بیش از اندازه و خونریزی غیر طبیعی می باشد بایستی به پزشک خود مراجعه کنید .