

آنژیوگرافی عروق کرونر

آنژیوگرافی یکی از روش های تشخیصی بیماری قلبی و عروقی ، جهت شناسایی محل و وسعت گرفتگی رگهای خونی قلب از طریق ماده حاجب و اشعه ایکس می باشد . در طی آنژیوگرافی برای ایجاد تصاویر با اشعه ایکس ، پزشک از طریق یک لوله نازک و انعطاف پذیر ، به نام کاتتر ، یک مایع رنگی تزریق می کند.

این مایع رنگی باعث می شود خون موجود در رگ های خونی در اشعه ایکس قابل مشاهده شود و هر ناحیه باریک یا مسدود شده در رگ را نشان دهد.

این رنگ بعداً از طریق کلیه ها و ادرار از بدن شما خارج می شود.



در مورد آنژیوگرافی از دست بلافاصله شیت مچ دست خارج شده و برای جلوگیری از خونریزی از رگ دست ، از وسیله ای به نام (تی آر بند) استفاده می شود.

آنژیوگرافی عروق کرونر از طریق شریانهای دست و یا پا انجام می شود و در صورت نرمال بودن شرایط در حدود ۳۰ دقیقه طول می کشد .

تی آر بند

مانند یک بالشتک پلاستیکی است که به دور مچ دست بسته می شود و کیسه هوای آن با استفاده از یک سرنگ باد می شود. این کیسه هوا در ساعت های بعدی به تدریج توسط پرستار خالی شده و در نهایت از مچ دست خارج می شود.



قبل از آنژیوگرافی چه آمادگی مورد نیاز است ؟

حتما پزشک خود را از سابقه هر گونه بیماری و داروهای مصرفی مطلع سازید.

روز قبل از انجام آنژیوگرافی جهت آزمایشات تکمیلی و تشکیل پرونده مراجعه نمایید.

در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خونی مانند وارفارین از ۴ تا ۵ روز قبل از مصرف دارو را متوقف کنید .

در صورت حساسیت به غذاهای دریایی مثل میگو یا ماهی و یا توت فرنگی یا حساسیت به مواد رنگی و یا حاجب در گذشته پزشک را در جریان قرار دهید.

از خوردن و آشامیدن به مدت ۸ ساعت قبل از آنژیوگرافی خودداری نمایید.

یک روز قبل از آنژیوگرافی به حمام بروید و موهای زائد کشاله ران ، قفسه سینه و ناحیه زیر بغل و دست راست خود را بتراشید.

اگر باردار هستید پزشک را مطلع سازید.

از بکار بردن لوازم آرایش خودداری نمایید.

زمانیکه برای آنژیوگرافی مراجعه می کنید از پوشیدن زیورآلات خودداری نموده و دندان مصنوعی خود را خارج نمایید و یک همراه داشته باشید.

در صورتیکه قبلا عمل قلب باز شده اید شرح عمل قلبی را به همراه داشته باشد.

بعد از آنژیوگرافی

بعد از انجام آنژیوگرافی شما به بخش مراقبت های بعد از آنژیوگرافی منتقل می شوید و پس از پایدار شدن وضعیت و طبق دستور پزشک از بیمارستان مرخص می شود .

دو عارضه بعد از آنژیوگرافی ممکن است مشاهده نمایید

که جای نگرانی نیست :

درد خفیف ، کبودی و یا تغییر رنگ در ناحیه انجام عمل

داشته باشید ، طبیعی است و بعد از چند روز از بین می رود.

دراطراف محل زخم ورم کوچکی شبیه توده در ابعاد یک

نخود و یا ریزتر ممکن است ایجاد شود که جای نگرانی

نیست و برطرف می شود .



لازم است در منزل به توصیه های

زیر عمل نمایید:

پیاده روی از روزی ۵ دقیقه آغاز کرده و به تدریج مدت آن را به ۳۵ دقیقه در روز برسانید .


به مدت ۵ تا ۷ روز از انجام فعالیت های سنگین و بلند کردن اشیاء سنگین خودداری نمایید.



بنیاد قلب فارس

بیمارستان کوثر شیراز

آنژیوگرافی عروق قلب



شماره سند : PF-PED-0300

تاریخ بازنگری : 1401/09/26

تهیه کننده: سعیده زارع

طراحی و تنظیم: مژده کاظمی پور
تحت نظارت کارگروه آموزش به بیمار

تایید کننده: دکتر فرزاد عدل

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق

مرجع

کتاب پرستاری داخلی جراحی برون-سودارت (جلد ۵ قلب و عروق)

کتاب بیماریهای قلب و عروق هاریسون

شیراز - خیابان قصردهشت - بعد از پل زیر گذر - بنیاد قلب فارس

بیمارستان کوثر - صندوق پستی: ۶۹۷-۷۱۹۵۵

تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۳۱۵۱۵ - ۰۷۱-۳۶۲۵۰۵۰۰

www.kowsar-hospital.ir

shiraz_kowsar_hospital

در صورتی که بعد از آنژیوگرافی علائم زیر را داشتید

به پزشک مراجعه نمایید:

- درد، سردی، گزگز و بیحسی در انگشتان پا یا دست عمل شده
- تنگی نفس، خارش بدن، راش
- خونریزی از ناحیه آنژیوگرافی که به مدت ۱۰ دقیقه روی ناحیه فشار وارد کرده، روی سطح صاف دراز بکشید.
- قرمزی، تورم، ترشح از ناحیه عمل و تب
- درد قفسه سینه و تنگی نفس علی الخصوص بعد از فعالیت و یا درد در حال افزایش قفسه سینه
- سفتی، حساسیت به لمس همراه با درد و گرمی در ناحیه انجام آنژیوگرافی
- احساس ضعف و کاهش سطح هوشیاری
- در صورتی که درد قفسه سینه یا سوزش جناغ سینه احساس کردید در وضعیت ثابت قرار بگیرید، قرص نیتروگلیسرین استفاده نمایید، پنج دقیقه صبر کنید. در صورت ادامه درد قرص دوم را استفاده کنید و پنج دقیقه صبر کنید و اگر درد هنوز ادامه داشت قرص سوم را مصرف نمایید و به نزدیکترین مرکز مراجعه نمایید.



سوالات خود را در مورد آنژیوگرافی قلب از ما بپرسید:

تماس با ۰۷۱-۳۶۱۴۱۵۱۰ در ساعات اداری

پیام واتساپ به شماره ۰۹۹۱۷۳۲۸۱۰۲ از ساعت ۰۷:۳۰ - ۱۹:۳۰

نوبت دهی اینترنتی: <https://nobat.kowsar-hospital.ir/nobat>

تلفن گویای پذیرش ۲۴ ساعته نوبت دهی درمانگاه ۰۷۱۳۶۱۴۱۰۰۰

- در صورتی که از طریق دست آنژیوگرافی انجام شده باشد به مدت ۲ هفته با دست عمل شده کار سنگین انجام ندهید.
- به مدت ۳ روز از رانندگی خودداری کنید.
- مدت ۵ تا ۷ روز از انجام فعالیت جنسی خودداری نمایید.
- پانسمان ناحیه عمل در روز بعد ترخیص برداشته و نیازی پانسمان مجدد نمی باشد.
- به مدت ۱ هفته آب فراوان به دلیل دفع ماده رنگی تزریق شده حین آنژیوگرافی مصرف نمایید تا از آسیب به کلیه جلوگیری شود.
- رژیم غذایی کم نمک و کم چرب داشته باشید.
- میوه جات و سبزیجات تازه مصرف نمایید.



charkhak.ir

با سبک زندگی سالم از بروز بیماری های قلبی پیشگیری

نمایید:

- از نوشیدن الکل و سایر مشروبات الکلی و استعمال دخانیات خودداری نمایید.
- پیاده روی و فعالیت بدنی منظم داشته باشید.
- از استرس و شلوغی و سروصدا دوری کنید.
- رژیم غذایی کم نمک و کم چرب را رعایت نمایید.
- از مصرف قهوه، مواد حاوی کافئین، الکل و نوشیدنی گازدار پرهیز نمایید.